

**EGZAMIN MATURALNY**  
**OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015**

**MATEMATYKA**  
**POZIOM ROZSZERZONY**

**ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA**  
**(A1, A2, A3, A4, A6, A7)**

**GRUDZIEŃ 2013**

**Zadanie 1.** (1 p.)

Dane są dwie urny z kulami. W każdej jest 5 kul. W pierwszej urnie jest jedna kula biała i 4 kule czarne. W drugiej urnie są 3 kule białe i 2 kule czarne. Rzucamy jeden raz symetryczną sześcienną kostką do gry. Jeśli wypadnie jedno lub dwa oczka, to losujemy jedną kulę z pierwszej urny, jeśli wypadną co najmniej trzy oczka, to losujemy jedną kulę z drugiej urny. Prawdopodobieństwo wylosowania kuli białej jest równe

A.  $\frac{1}{15}$ .

B.  $\frac{2}{5}$ .

C.  $\frac{7}{15}$ .

D.  $\frac{3}{5}$ .

**Wymagania ogólne**


IV. Użycie i tworzenie strategii.

**Wymagania szczegółowe**

10.3R Uczeń korzysta z twierdzenia o prawdopodobieństwie całkowitym.

**Rozwiązanie (I sposób)**

Rozwiązujemy zadanie metodą drzewa.



Następnie obliczamy prawdopodobieństwo wylosowania kuli białej:  $\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{5} + \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{5} = \frac{7}{15}$ .

Odp.: C.

**Rozwiązanie (II sposób)**

Niech  $U_1$  i  $U_2$  oznaczają odpowiednio zdarzenie polegające na wylosowaniu kuli z pierwszej urny i zdarzenie polegające na wylosowaniu kuli z drugiej urny.

Zdarzenia  $U_1$  i  $U_2$  spełniają warunki:

1.  $U_1 \cap U_2 = \emptyset$ ,
2.  $U_1 \cup U_2 = \Omega$ ,
3.  $P(U_1) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3} > 0$ ,
4.  $P(U_2) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3} > 0$ .

Rozważmy zdarzenie  $B$  polegające na wylosowaniu kuli białej.

Prawdopodobieństwo tego zdarzenia możemy obliczyć, korzystając ze wzoru

$$P(B) = P(B|U_1) \cdot P(U_1) + P(B|U_2) \cdot P(U_2),$$

gdzie prawdopodobieństwo wylosowania kuli białej pod warunkiem, że losujemy z pierwszej urny, jest równe  $P(B|U_1) = \frac{1}{5}$  i prawdopodobieństwo wylosowania kuli białej pod warunkiem, że losujemy z drugiej urny, jest równe  $P(B|U_2) = \frac{3}{5}$ .

$$\text{Obliczamy } P(B) = \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{3} + \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{3} = \frac{7}{15}.$$

**Odp.: C.**

### Zadanie 2. (1 p.)

Dany jest nieskończony ciąg geometryczny  $(a_n)$  określony wzorem

$$a_n = \frac{3}{(\sqrt{2})^n} \quad \text{dla } n = 1, 2, 3, \dots$$

Suma wszystkich wyrazów tego ciągu jest równa

A.  $\frac{1}{\sqrt{2}-1}$ .      B.  $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}-1}$ .      C.  $\frac{2}{\sqrt{2}-1}$ .      D.  $\frac{3}{\sqrt{2}-1}$ .

#### Wymagania ogólne

IV. Użycie i tworzenie strategii.

#### Wymagania szczegółowe

5.3R Uczeń rozpoznaje szeregi geometryczne zbieżne i oblicza ich sumy.

### Rozwiązanie

Pierwszy wyraz i iloraz tego ciągu są odpowiednio równe:  $a_1 = \frac{3}{\sqrt{2}}$ ,  $q = \frac{1}{\sqrt{2}}$ .

Ponieważ  $|q| = \left| \frac{1}{\sqrt{2}} \right| < 1$ , więc mamy  $S = \frac{a_1}{1-q} = \frac{\frac{3}{\sqrt{2}}}{1-\frac{1}{\sqrt{2}}} = \frac{3}{\sqrt{2}-1}$ .

**Odp.: D.**

### Zadanie 3. (1 p.)

Liczba  $\frac{27^{665} \cdot \sqrt[3]{3^{-92}}}{\left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{152}{3}}}$  jest równa

A.  $3^{725}$ .      B.  $3^{1995}$ .      C.  $3^{2015}$ .      D.  $3^{2045}$ .

**Wymagania ogólne**

IV. Użycie i tworzenie strategii.

**Wymagania szczegółowe**

1.4 Uczeń oblicza potęgę o wykładnikach wymiernych i stosuje prawa działań na potęgach o wykładnikach wymiernych.

**Rozwiązanie**

Obliczamy, korzystając z działań na potęgach

$$\frac{27^{665} \cdot \sqrt[3]{3^{-92}}}{\left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{152}{3}}} = \frac{3^{3 \cdot 665} \cdot (3^{-92})^{\frac{1}{3}}}{3^{-\frac{152}{3}}} = 3^{1995 - \frac{92}{3} + \frac{152}{3}} = 3^{2015}.$$

Odp.: C.

**Zadanie 4. (1 p.)**

Dane są dwa okręgi: okrąg  $o_1$  o równaniu  $x^2 + (y-1)^2 = 25$  oraz okrąg  $o_2$  o równaniu  $(x-1)^2 + y^2 = 9$ .

- A. Te okręgi przecinają się w dwóch punktach.
- B. Te okręgi są styczne.
- C. Te okręgi nie mają punktów wspólnych oraz okrąg  $o_1$  leży w całości wewnątrz okręgu  $o_2$ .
- D. Te okręgi nie mają punktów wspólnych oraz okrąg  $o_2$  leży w całości wewnątrz okręgu  $o_1$ .

**Wymagania ogólne**


IV. Użycie i tworzenie strategii.

**Wymagania szczegółowe**

8.5R Uczeń posługuje się równaniem okręgu  $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$  oraz opisuje koła za pomocą nierówności.

**Rozwiązanie (I sposób)**

Szkicujemy oba okręgi w jednym układzie współrzędnych i stwierdzamy, że drugi okrąg leży w całości wewnątrz pierwszego.



**Odp.: D.**

### Rozwiązanie (II sposób)

Wyznaczamy środki i promienie okręgów odpowiednio  $S_1 = (0, 1)$  i  $R = 5$  oraz  $S_2 = (1, 0)$  i  $r = 3$ .

Obliczamy  $|S_1 S_2| = \sqrt{(1-0)^2 + (0-1)^2} = \sqrt{2}$  oraz  $|R-r| = 5-3 = 2$ .

Stwierdzamy, że zachodzi warunek  $|S_1 S_2| < |R-r|$ , tzn. okręgi są rozłączne wewnętrznie i drugi okrąg leży w całości wewnątrz pierwszego.

**Odp.: D.**

### Zadanie 5. (1 p.)

Suma  $\sin \alpha + \sin 3\alpha$  jest dla każdego  $\alpha$  równa

- A.  $\sin 4\alpha$ .
- B.  $2 \sin 4\alpha$ .
- C.  $2 \sin 2\alpha \cos \alpha$ .
- D.  $2 \sin \alpha \cos 2\alpha$ .

#### Wymagania ogólne

II. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji.

#### Wymagania szczegółowe

6.5R Uczeń stosuje wzory na sinus i cosinus sumy i różnicy kątów, sumę i różnicę sinusów i cosinusów.

### Rozwiązanie (I sposób)

Korzystamy ze wzoru  $\sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$ .

Mamy zatem

$$\sin \alpha + \sin 3\alpha = \sin 3\alpha + \sin \alpha = 2 \sin \frac{3\alpha + \alpha}{2} \cos \frac{3\alpha - \alpha}{2} = 2 \sin 2\alpha \cdot \cos \alpha.$$

**Odp.: C.**

### Rozwiązanie (II sposób)

Korzystamy ze wzorów

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta \quad \text{oraz} \quad \cos 2\alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1.$$

Mamy zatem

$$\begin{aligned} \sin 3\alpha &= \sin(\alpha + 2\alpha) = \sin \alpha \cos 2\alpha + \cos \alpha \sin 2\alpha = \sin \alpha \cos 2\alpha + 2 \sin \alpha \cos^2 \alpha = \\ &= \sin \alpha (4 \cos^2 \alpha - 1). \end{aligned}$$

A stąd otrzymujemy:

$$\begin{aligned}\sin \alpha + \sin 3\alpha &= \sin \alpha + \sin \alpha(4 \cos^2 \alpha - 1) = \sin \alpha(1 + 4 \cos^2 \alpha - 1) = \\ &= 4 \sin \alpha \cos^2 \alpha = 2(2 \sin \alpha \cos \alpha) \cos \alpha = 2 \sin 2\alpha \cos \alpha.\end{aligned}$$

**Odp.: C.**

## Zadanie 6. (2 p.)

Liczba  $n$  jest najmniejszą liczbą całkowitą spełniającą równanie

$$2 \cdot |x + 57| = |x - 39|.$$

Zakoduj cyfry: setek, dziesiątek i jedności liczby  $|n|$ .

### Wymagania ogólne

II. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji.

### Wymagania szczegółowe

3.9R Uczeń rozwiązuje równania i nierówności z wartością bezwzględną o poziomie trudności nie wyższym niż:  $||x + 1| - 2| = 3$ ,  $|x + 3| + |x - 5| > 12$ .

## Rozwiązanie (I sposób)

Przyjrzyjmy się interpretacji geometrycznej rozważanego równania. Na osi liczbowej dane są dwa punkty  $A$  i  $B$  o współrzędnych:  $A = -57$  oraz  $B = 39$ . Szukamy takich punktów  $X$ , dla których odległość od punktu  $B$  jest dwukrotnie większa od odległości od punktu  $A$ . Są dwa takie punkty  $X$ . Ponieważ odległość od  $A$  do  $B$  jest równa 96, więc jeden z nich (nazwijmy go  $X_1$ ) leży w odległości 96 na lewo od punktu  $A$ , drugi zaś (nazwijmy go  $X_2$ ) leży w odległości  $\frac{96}{3} = 32$  na prawo od punktu  $A$ . Ponieważ  $-57 - 96 = -153$  oraz  $-57 + 32 = -25$ , więc szukaną liczbą  $n$  jest  $n = -153$  oraz  $|n| = 153$ .

W karcie odpowiedzi kodujemy cyfry: 1, 5, 3.

## Schemat oceniania I sposobu rozwiązania

Zdający otrzymuje ..... 2 p.  
gdy zakoduje cyfry: 1, 5, 3.

## Rozwiązanie (II sposób) — zapisanie trzech przypadków

Wyróżniamy na osi liczbowej przedziały:  $(-\infty, -57)$ ,  $(-57, 39)$ ,  $(39, +\infty)$ .

Rozwiązujemy równania w poszczególnych przedziałach i sprawdzamy, czy otrzymana liczba należy do danego przedziału.

$x \in (-\infty, -57)$	$x \in (-57, 39)$	$x \in (39, +\infty)$
$2 \cdot (-x - 57) = -x + 39$ $-x = 39 + 114$ $x = -153$	$2 \cdot (x + 57) = -x + 39$ $3x = 39 - 114$ $3x = -75$ $x = -25$	$2 \cdot (x + 57) = x - 39$ $x = -39 - 114$ $x = -153$ Równanie nie ma rozwiązania w tym przedziale.

Stąd wynika, że  $n = -153$  oraz  $|n| = 153$ .

Zatem kodujemy cyfry: 1, 5, 3.

Albo:

Wyróżniamy na osi liczbowej przedziały:  $(-\infty, -57)$ ,  $(-57, 39)$ ,  $(39, +\infty)$ .

Zauważamy, że jeżeli w przedziale  $(-\infty, -57)$  istnieje najmniejsza liczba całkowita spełniająca to równanie, to jest to szukana liczba  $n$ .

Rozwiązujemy dane równanie w przedziale  $(-\infty, -57)$ :

$$2 \cdot (-x - 57) = -x + 39,$$

$$-x = 39 + 114,$$

stąd  $x = -153$ .

Najmniejszą liczbą całkowitą spełniającą to równanie jest liczba  $n = -153$ , więc  $|n| = 153$ .

Zatem kodujemy cyfry: 1, 5, 3.

## Schemat oceniania II sposobu rozwiązania

Zdający otrzymuje ..... 2 p.  
gdy zakoduje cyfry: 1, 5, 3.

## Rozwiązanie (III sposób) — własności wartości bezwzględnej

Zapisujemy równanie  $2 \cdot |x + 57| = |x - 39|$  w postaci:

$$2 \cdot (x + 57) = -x + 39$$

$$3x = 39 - 114$$

$$3x = -75$$

$$x = -25$$

lub

$$2 \cdot (x + 57) = x - 39$$

$$x = -39 - 114$$

$$x = -153$$

Najmniejszą liczbą całkowitą spełniającą to równanie jest liczba  $n = -153$ , więc  $|n| = 153$ .

Zatem kodujemy cyfry: 1, 5, 3.

## Schemat oceniania III sposobu rozwiązania

Zdający otrzymuje ..... 2 p.  
gdy zakoduje cyfry: 1, 5, 3.

**Zadanie 7.** (2 p.)

Oblicz granicę ciągu

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2 - 5n + 2}{(8n + 7)(n + 4)}.$$

Zakoduj trzy pierwsze cyfry po przecinku rozwinięcia dziesiętnego obliczonej granicy.

**Wymagania ogólne**

II. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji.

**Wymagania szczegółowe**

5.2R Uczeń oblicza granice ciągów, korzystając z granic ciągów typu  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n^2}$  oraz z twierdzeń o działaniach na granicach ciągów.

**Rozwiązanie**

Ta granica jest równa

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2 - 5n + 2}{(8n + 7)(n + 4)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3 - \frac{5}{n} + \frac{2}{n^2}}{\left(8 + \frac{7}{n}\right)\left(1 + \frac{4}{n}\right)} = \frac{3}{8} = 0,375.$$

W karcie odpowiedzi należy zatem zakodować cyfry 3, 7, 5.

**Schemat oceniania**

Zdający otrzymuje ..... **2 p.**  
gdy zakoduje pierwsze trzy cyfry po przecinku rozwinięcia dziesiętnego obliczonej granicy: cyfry 3, 7, 5.

**Zadanie 8.** (2 p.)

Dana jest funkcja  $f$  określona wzorem

$$f(x) = \frac{x - 8}{x^2 + 6}$$

dla każdej liczby rzeczywistej  $x$ . Oblicz wartość pochodnej tej funkcji w punkcie  $x = \frac{1}{2}$ . Zakoduj trzy pierwsze cyfry po przecinku rozwinięcia dziesiętnego otrzymanego wyniku.

**Wymagania ogólne**

II. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji.

**Wymagania szczegółowe**

11.2R Uczeń oblicza pochodne funkcji wymiernych.

**Rozwiązanie**

$$\begin{aligned} \text{Mamy } f'(x) &= \frac{(x-8)'(x^2+6) - (x-8)(x^2+6)'}{(x^2+6)^2} = \frac{x^2+6 - 2x(x-8)}{(x^2+6)^2} = \\ &= \frac{x^2+6 - 2x^2 + 16x}{(x^2+6)^2} = \frac{-x^2 + 16x + 6}{(x^2+6)^2}. \end{aligned}$$

$$\text{Zatem } f'\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{-\frac{1}{4} + 8 + 6}{\left(\frac{1}{4} + 6\right)^2} = \frac{\frac{55}{4}}{\left(\frac{25}{4}\right)^2} = \frac{55}{4} \cdot \frac{16}{625} = \frac{44}{125} = 0,352.$$

W karcie odpowiedzi należy zakodować cyfry 3, 5, 2.

**Schemat oceniania**

**Zdający otrzymuje** ..... **2 p.**  
gdy zakoduje cyfry 3, 5, 2.

**Zadanie 9.** (2 p.)

Oblicz

$$\log_3 \sqrt[4]{27} - \log_3 \left( \log_3 \sqrt[3]{\sqrt[3]{3}} \right).$$

Zakoduj cyfrę jedności i dwie pierwsze cyfry po przecinku rozwinięcia dziesiętnego otrzymanego wyniku.

**Wymagania ogólne**

*II. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji.*

**Wymagania szczegółowe**

*1.2R Uczeń stosuje w obliczeniach wzór na logarytm potęgi oraz wzór na zamianę podstawy logarytmu.*

**Rozwiązanie**


$$\log_3 \sqrt[4]{27} - \log_3 (\log_3 \sqrt[3]{\sqrt[3]{3}}) = \log_3 \frac{27^{\frac{1}{4}}}{\log_3 3^{\frac{1}{9}}} = \log_3 \frac{3^{\frac{3}{4}}}{3^{-2}} = \log_3 3^{2\frac{3}{4}} = 2,75.$$

**Schemat oceniania**

**Zdający otrzymuje** ..... **2 p.**  
gdy odpowiednio zakoduje cyfry: 2, 7, 5.

**Zadanie 10.** (3 p.)

Punkty  $P_1, P_2, P_3, \dots, P_{23}, P_{24}$  dzielą okrąg na 24 równe łuki (zobacz rysunek). Punkt  $A$  jest punktem przecięcia cięciw  $P_{11}P_{22}$  i  $P_1P_{16}$ .



Udowodnij, że  $|\sphericalangle P_{16}AP_{11}| = 60^\circ$ .

### Wymagania ogólne


V. Rozumowanie i argumentacja.

### Wymagania szczegółowe

7.1 Uczeń stosuje zależności między kątem środkowym i kątem wpisanym.

### Rozwiązanie (I sposób)

Narysujmy cięciwę  $P_1P_{11}$ .



Kąt wpisany  $P_{11}P_1P_{16}$  jest oparty na krótszym łuku  $P_{16}P_{11}$ . Łuk ten stanowi  $\frac{5}{24}$  okręgu. Zatem kąt środkowy oparty na tym łuku ma miarę  $\frac{5}{24} \cdot 360^\circ = 75^\circ$ . Stąd wynika, że kąt wpisany oparty na tym łuku ma miarę  $37,5^\circ$ . Podobnie stwierdzamy, że kąt wpisany  $P_1P_{11}P_{22}$  jest oparty na łuku stanowiącym  $\frac{3}{24}$  okręgu, a więc ma miarę  $22,5^\circ$ . Stąd wynika, że

$$|\sphericalangle P_{11}AP_{16}| = 180^\circ - (180^\circ - 22,5^\circ - 37,5^\circ) = 60^\circ.$$

## Schemat oceniania I sposobu rozwiązania

**Rozwiązanie, w którym jest istotny postęp** ..... **1 p.**  
 Zdający obliczy miarę jednego z dwóch kątów wpisanych, opartych na łukach  $P_{11}P_{16}$  lub  $P_1P_{22}$ :

$$|\sphericalangle P_{16}P_1P_{11}| = 37,5^\circ, \quad |\sphericalangle P_1P_{11}P_{22}| = 22,5^\circ.$$


**Pokonanie zasadniczych trudności zadania** ..... **2 p.**  
 Zdający obliczy miary dwóch kątów wpisanych, opartych na łukach  $P_{11}P_{16}$  oraz  $P_1P_{22}$ :

$$|\sphericalangle P_{16}P_1P_{11}| = 37,5^\circ, \quad |\sphericalangle P_1P_{11}P_{22}| = 22,5^\circ.$$

**Rozwiązanie pełne** ..... **3 p.**  
 Zdający obliczy miarę kąta  $P_{11}AP_{16}$ .


## Rozwiązanie (II sposób)

Zauważmy najpierw (zobacz rysunek), że jeżeli łuki  $AD$  i  $BC$  są równe, przy czym punkty  $C$  i  $D$  leżą po tej samej stronie prostej  $AB$ , to proste  $AB$  i  $CD$  są równoległe.



Wynika to wprost z równości kątów  $BAC$  i  $ACD$  (kąty wpisane oparte na równych łukach).

Ponieważ punkty  $P_1$  i  $P_{22}$  oraz  $P_8$  i  $P_{11}$  wyznaczają łuki o tej samej długości, więc cięciwa  $P_1P_8$  jest równoległa do  $P_{11}P_{22}$ .



Kąt wpisany  $P_8P_1P_{16}$  jest oparty na krótszym z łuków  $P_8P_{16}$ , który stanowi  $\frac{8}{24} = \frac{1}{3}$  okręgu, więc

$$|\sphericalangle P_8P_1P_{16}| = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot 360^\circ = 60^\circ.$$

## Schemat oceniania II sposobu rozwiązania

**Rozwiązanie, w którym jest istotny postęp** ..... 1 p.

Zdający narysuje cięciwę  $P_1P_8$  i zapisze, że jest ona równoległa do cięciwy  $P_{11}P_{22}$ .

**Rozwiązanie pełne** ..... 3 p.

Zdający obliczy miarę kąta  $P_{11}AP_{16}$ .

## Zadanie 11. (3 p.)

Udowodnij, że dla każdej liczby rzeczywistej  $x$  i każdej liczby rzeczywistej  $m$  prawdziwa jest nierówność

$$20x^2 - 24mx + 18m^2 \geq 4x + 12m - 5.$$

### Wymagania ogólne

V. Rozumowanie i argumentacja.

### Wymagania szczegółowe

3.2R Uczeń rozwiązuje równania i nierówności liniowe i kwadratowe z parametrem.

## Rozwiązanie (I sposób)

Przekształcamy daną nierówność w sposób równoważny do postaci:

$$20x^2 - 24mx + 18m^2 - 4x - 12m + 5 \geq 0.$$

Sposób „trikowy” polega na odpowiednim grupowaniu:

$$20x^2 - 24mx + 18m^2 - 4x - 12m + 5 = (2x - 1)^2 + (3m - 2)^2 + (4x - 3m)^2.$$

Ponieważ  $(2x-1)^2 + (3m-2)^2 + (4x-3m)^2 \geq 0$ , więc dla każdej liczby rzeczywistej  $x$  i każdej liczby rzeczywistej  $m$  prawdziwa jest nierówność:  $20x^2 - 24mx + 18m^2 \geq 4x + 12m - 5$ .

## Schemat oceniania I sposobu rozwiązania

**Pokonanie zasadniczych trudności zadania** ..... **2 p.**

Zdający doprowadzi wyrażenie do postaci  $(2x-1)^2 + (3m-2)^2 + (4x-3m)^2$  i na tym poprzestanie lub wyciągnie błędny wniosek, np. taki, że wyrażenie jest dodatnie dla dowolnych liczb  $x$  i  $m$ .

**Rozwiązanie pełne** ..... **3 p.**

Zdający przeprowadzi pełne rozumowanie.

## Rozwiązanie (II sposób)

Inny sposób polega na potraktowaniu wyrażenia  $20x^2 - 24mx + 18m^2 - 4x - 12m + 5$  jako trójmianu kwadratowego zmiennej  $x$  z parametrem  $m$ :

$$20x^2 - 24mx + 18m^2 - 4x - 12m + 5 = 20x^2 - (24m + 4)x + (18m^2 - 12m + 5).$$

Trójmian ten ma dodatni współczynnik przy  $x^2$  oraz niedodatni wyróżnik dla każdego  $m$ :

$$\Delta = (24m + 4)^2 - 4 \cdot 20 \cdot (18m^2 - 12m + 5) = -864m^2 + 1152m - 384 = -96(3m - 2)^2.$$

Zatem dla każdego  $x$  (i dla każdego  $m$ ) wartość tego trójmianu jest nieujemna.

## Schemat oceniania II sposobu rozwiązania

**Rozwiązanie, w którym jest istotny postęp** ..... **1 p.**

Zdający zapisze, że rozważa trójmian kwadratowy i obliczy jego wyróżnik.

**Pokonanie zasadniczych trudności zadania** ..... **2 p.**

Zdający pokaże, że wyróżnik trójmianu  $20x^2 - (24m + 4)x + (18m^2 - 12m + 5)$  jest niedodatni lub obliczy wyróżnik kwadratowy trójmianu  $-864m^2 + 1152m - 384$ .

**Rozwiązanie pełne** ..... **3 p.**

Zdający zapisze wniosek dotyczący trójmianu  $20x^2 - (24m + 4)x + (18m^2 - 12m + 5)$ :

Trójmian ten ma dodatni współczynnik przy  $x^2$  oraz niedodatni wyróżnik dla każdego  $m$ , zatem dla każdego  $x$  (i dla każdego  $m$ ) wartość tego trójmianu jest nieujemna.

## Zadanie 12. (3 p.)

Janek przeprowadza doświadczenie losowe, w którym jako wynik może otrzymać jedną z liczb:

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prawdopodobieństwo  $p_k$  otrzymania liczby  $k$  jest dane wzorem:  $p_k = \frac{1}{64} \cdot \binom{6}{k}$ .

Rozważamy dwa zdarzenia:

- zdarzenie  $A$  polegające na otrzymaniu liczby ze zbioru  $\{1, 3, 5\}$ ,
- zdarzenie  $B$  polegające na otrzymaniu liczby ze zbioru  $\{2, 3, 4, 5, 6\}$ .

Oblicz prawdopodobieństwo warunkowe  $P(A|B)$ .

### Wymagania ogólne

III. Modelowanie matematyczne.

### Wymagania szczegółowe

10.2R Uczeń oblicza prawdopodobieństwo warunkowe.

### Rozwiązanie

Obliczamy:

$$p_0 = \frac{1}{64}, p_1 = \frac{6}{64}, p_2 = \frac{15}{64}, p_3 = \frac{20}{64}, p_4 = \frac{15}{64}, p_5 = \frac{6}{64}, p_6 = \frac{1}{64}.$$

Korzystamy teraz ze wzoru  $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$ . Zdarzenie  $A \cap B$  polega na wylosowaniu jednej z liczb: 3, 5.

$$P(A \cap B) = p_3 + p_5 = \frac{26}{64},$$

$$P(B) = p_2 + p_3 + p_4 + p_5 + p_6 = \frac{57}{64}.$$

Stąd wynika, że  $P(A|B) = \frac{26}{64} \cdot \frac{64}{57} = \frac{26}{57} \approx 0,45614$ .

### Schemat oceniania

**Rozwiązanie, w którym jest istotny postęp** ..... 1 p.

Obliczenie prawdopodobieństw  $p_2, \dots, p_6$ :

$$p_2 = \frac{15}{64}, p_3 = \frac{20}{64}, p_4 = \frac{15}{64}, p_5 = \frac{6}{64}, p_6 = \frac{1}{64}.$$

**Pokonanie zasadniczych trudności zadania** ..... 2 p.

Obliczenie prawdopodobieństwa zajścia zdarzenia  $A \cap B$  lub zdarzenia  $B$ :

$$P(A \cap B) = \frac{26}{64}, \quad P(B) = \frac{57}{64}.$$

**Rozwiązanie pełne** ..... 3 p.

Obliczenie prawdopodobieństwa warunkowego  $P(A|B)$  zdarzenia  $A$  pod warunkiem zajścia zdarzenia  $B$ :

$$P(A|B) = \frac{26}{57} = 0,45614\dots$$

**Uwaga 1.** Zdający może tylko obliczyć prawdopodobieństwa  $p_2, p_3, \dots, p_6$ .

**Uwaga 2.** Zdający może obliczyć prawdopodobieństwa  $p_0, p_1, \dots, p_6$  korzystając bezpośrednio z definicji symbolu Newtona.

### Zadanie 13. (3 p.)

Wyznacz wszystkie wartości parametru  $m$ , dla których prosta o równaniu  $y = mx + (2m + 3)$  ma dokładnie dwa punkty wspólne z okręgiem o środku w punkcie  $S = (0, 0)$  i promieniu  $r = 3$ .

#### Wymagania ogólne

III. Modelowanie matematyczne.

#### Wymagania szczegółowe

8.6R Uczeń wyznacza punkty wspólne prostej i okręgu.

### Rozwiązanie (I sposób)

Dla żadnego parametru  $m$  prosta o równaniu  $y = mx + (2m + 3)$  nie jest równoległa do osi  $Oy$ . Wynika stąd, że jeśli taka prosta przecina okrąg, to współrzędne  $x$  obu punktów przecięcia są różne. To znaczy, że do stwierdzenia, czy któraś z rozważanych prostych przecina okrąg w dwóch punktach, wystarczy stwierdzić, czy równanie

$$x^2 + (mx + (2m + 3))^2 = 9$$

z niewiadomą  $x$  i parametrem  $m$  ma dwa rozwiązania. Przekształćmy to równanie:

$$\begin{aligned} x^2 + (mx + (2m + 3))^2 &= 9, \\ x^2 + m^2 x^2 + 2m(2m + 3)x + (2m + 3)^2 - 9 &= 0, \\ (m^2 + 1)x^2 + 2m(2m + 3)x + 4m^2 + 12m &= 0. \end{aligned}$$

Ponieważ  $m^2 + 1 \neq 0$ , więc dla każdego  $m$  jest to równanie kwadratowe. Ma ono dwa rozwiązania wtedy i tylko wtedy, gdy jego wyróżnik jest dodatni. Obliczamy zatem ten wyróżnik:

$$\begin{aligned} \Delta &= 4m^2(2m + 3)^2 - 4(m^2 + 1)(4m^2 + 12m) = \\ &= 4m(m(2m + 3)^2 - 4(m^2 + 1)(m + 3)) = \\ &= 4m(4m^3 + 12m^2 + 9m - 4m^3 - 12m^2 - 4m - 12) = \\ &= 4m(5m - 12) \end{aligned}$$

Wyróżnik  $\Delta$  jest dodatni wtedy i tylko wtedy, gdy  $m < 0$  lub  $m > \frac{12}{5}$ . Zatem rozważana prosta przecina dany okrąg w dwóch punktach wtedy i tylko wtedy, gdy  $m < 0$  lub  $m > \frac{12}{5}$ .

### Schemat oceniania I sposobu rozwiązania

**Rozwiązanie, w którym jest istotny postęp** ..... 1 p.

Zapisanie równania  $x^2 + (mx + (2m + 3))^2 = 9$ .

**Pokonanie zasadniczych trudności zadania ..... 2 p.**

Obliczenie wyróżnika równania kwadratowego

$$(m^2 + 1)x^2 + 2m(2m + 3)x + 4m^2 + 12m = 0$$

i stwierdzenie, że wyróżnik równania powinien być dodatni:  $\Delta = 4m \cdot (5m - 12)$ ,  $\Delta > 0$ .**Rozwiązanie pełne ..... 3 p.**

Prosta  $y = mx + (2m + 3)$  przecina dany okrąg w dwóch punktach wtedy i tylko wtedy, gdy  $m < 0$  lub  $m > \frac{12}{5}$ .

**Rozwiązanie (II sposób)**

Dowolna prosta będzie miała dokładnie dwa punkty wspólne z okręgiem, jeżeli odległość środka okręgu od danej prostej będzie mniejsza od promienia okręgu.

Zapisujemy równanie danej prostej w postaci ogólnej:  $mx - y + (2m + 3) = 0$ .

Wyznaczamy odległość punktu  $S = (0, 0)$  od danej prostej:  $d = \frac{|2m + 3|}{\sqrt{m^2 + 1}}$ .

Odległość ma być mniejsza od promienia, zatem  $\frac{|2m + 3|}{\sqrt{m^2 + 1}} < 3$ .

Rozwiązujemy nierówność równoważną  $|2m + 3| < 3\sqrt{m^2 + 1}$ .

Obie strony nierówności są nieujemne, więc  $(2m + 3)^2 < 9(m^2 + 1)$ . Stąd  $-5m^2 + 12m < 0$ .

Rozwiązaniem nierówności  $-5m^2 + 12m < 0$  jest  $m < 0$  lub  $m > \frac{12}{5}$ .

Prosta  $y = mx + (2m + 3)$  przecina dany okrąg w dwóch punktach wtedy i tylko wtedy, gdy  $m < 0$  lub  $m > \frac{12}{5}$ .

**Uwaga**

Zdający może rozwiązać nierówność  $\frac{|2m + 3|}{\sqrt{m^2 + 1}} < 3$  w dwóch przedziałach:  $m < -\frac{3}{2}$  i  $m \geq -\frac{3}{2}$ . Ostatecznym rozwiązaniem będzie suma rozwiązań nierówności w każdym z przedziałów.

- Jeżeli  $m < -\frac{3}{2}$  to  $-2m - 3 < 3\sqrt{m^2 + 1}$ . Obie strony nierówności są nieujemne, wobec tego  $(-2m - 3)^2 < 9(m^2 + 1)$ . Stąd  $-5m^2 + 12m < 0$ . Dla  $m < -\frac{3}{2}$  rozwiązaniem nierówności  $-5m^2 + 12m < 0$  jest  $m < -\frac{3}{2}$ .
- Jeżeli  $m \geq -\frac{3}{2}$  to  $2m + 3 < 3\sqrt{m^2 + 1}$ . Obie strony nierówności są nieujemne, wobec tego  $(2m + 3)^2 < 9(m^2 + 1)$ . Stąd  $-5m^2 + 12m < 0$ . Dla  $m \geq -\frac{3}{2}$  rozwiązaniem nierówności  $-5m^2 + 12m < 0$  jest  $-\frac{3}{2} \leq m < 0$  i  $m > \frac{12}{5}$ .

Rozwiązaniem nierówności  $\frac{|2m+3|}{\sqrt{m^2+1}} < 3$  jest zatem suma rozwiązań, czyli  $m < 0$  lub  $m > \frac{12}{5}$ .

### Schemat oceniania II sposobu rozwiązania

**Rozwiązanie, w którym jest istotny postęp** ..... 1 p.

Wyznaczenie odległości środka okręgu od danej prostej:  $d = \frac{|2m+3|}{\sqrt{m^2+1}}$

**Pokonanie zasadniczych trudności zadania** ..... 2 p.

Przekształcenie nierówności wymiernej  $\frac{|2m+3|}{\sqrt{m^2+1}} < 3$  do nierówności kwadratowej  $-5m^2+12m < 0$

**Rozwiązanie pełne** ..... 3 p.

Prosta  $y = mx + (2m+3)$  przecina dany okrąg w dwóch punktach wtedy i tylko wtedy, gdy  $m < 0$  lub  $m > \frac{12}{5}$ .

### Zadanie 14. (3 p.)

Dana jest parabola o równaniu  $y = x^2 + 1$  i leżący na niej punkt  $A$  o współrzędnej  $x$  równej 3. Wyznacz równanie stycznej do paraboli w punkcie  $A$ .

#### Wymagania ogólne

*IV. Użycie i tworzenie strategii.*

#### Wymagania szczegółowe

*11.3R Uczeń korzysta z geometrycznej i fizycznej interpretacji pochodnej.*

### Rozwiązanie (I sposób)

Styczna do paraboli o równaniu  $y = f(x)$  w punkcie  $A = (x_0, f(x_0))$  ma równanie postaci  $y = ax + b$ , gdzie współczynnik kierunkowy  $a$  jest równy  $a = f'(x_0)$ . W naszym przypadku

$f(x) = x^2 + 1$  oraz  $x_0 = 3$ .

Mamy zatem  $f'(x) = 2x$ , skąd dostajemy  $a = 2 \cdot 3 = 6$ . Punkt  $A$  ma współrzędne  $(3, f(3))$ , czyli  $A = (3, 10)$ . Prosta o równaniu  $y = 6x + b$  ma przechodzić przez punkt  $A$ , a więc  $10 = 6 \cdot 3 + b$ . Zatem  $b = -8$  i ostatecznie równanie stycznej ma postać  $y = 6x - 8$ .

### Schemat oceniania I sposobu rozwiązania

**Rozwiązanie, w którym jest istotny postęp** ..... 1 p.

Wyznaczenie pochodnej funkcji  $f(x) = x^2 + 1$ :  $f'(x) = 2x$ .

**Pokonanie zasadniczych trudności zadania** ..... 2 p.

Obliczenie współczynnika kierunkowego stycznej:  $a = f'(3) = 6$ .

**Rozwiązanie pełne** ..... **3 p.**

Wyznaczenie równania stycznej do paraboli  $y = x^2 + 1$  w punkcie  $A: y = 6x - 8$ .

### Rozwiązanie (II sposób)

Prosta nierównoległa do osi paraboli będzie styczna do tej paraboli, jeżeli ma z parabolą dokładnie jeden punkt wspólny.

Obliczamy współrzędne punktu  $A: A = (3, 10)$ . Wyznaczamy równanie prostej przechodzącej przez punkt  $A: y = ax + 10 - 3a$ .

Ta prosta nie jest równoległa do osi paraboli, więc układ równań

$$\begin{cases} y = x^2 + 1 \\ y = ax + 10 - 3a \end{cases}$$

ma dokładnie jedno rozwiązanie, jeżeli równanie kwadratowe  $x^2 + 1 = ax + 10 - 3a$  ma jedno rozwiązanie.

Przekształcamy równanie do postaci  $x^2 - ax + 3a - 9 = 0$ .

Obliczamy wyróżnik równania kwadratowego:  $\Delta = a^2 - 12a + 36$ . Zatem równanie ma jedno rozwiązanie, jeżeli wyróżnik jest równy zero.

Rozwiązujemy równanie  $a^2 - 12a + 36 = 0$ , czyli  $(a - 6)^2 = 0$ . Jedynym rozwiązaniem tego równania jest  $a = 6$ .

Równanie prostej stycznej do paraboli  $y = x^2 + 1$  w punkcie  $A$  ma postać  $y = 6x - 8$ .

### Schemat oceniania II sposobu rozwiązania

**Rozwiązanie, w którym jest istotny postęp** ..... **1 p.**

Zapisanie równania  $x^2 + 1 = ax + 10 - 3a$ .

**Pokonanie zasadniczych trudności zadania** ..... **2 p.**


Obliczenie wyróżnika równania kwadratowego  $x^2 - ax + 3a - 9 = 0$  oraz wyznaczenie wartości  $a$ , dla której  $\Delta = 0$ , czyli  $a = 6$ .

**Rozwiązanie pełne** ..... **3 p.**

Wyznaczenie równania stycznej do paraboli  $y = x^2 + 1$  w punkcie  $A: y = 6x - 8$ .

### Zadanie 15. (3 p.)

W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym krawędź podstawy ma długość  $a$ . Kąt między krawędzią boczną a krawędzią podstawy ma miarę  $\alpha > 45^\circ$  (zobacz rysunek). Wyznacz objętość tego ostrosłupa.




### Wymagania ogólne

IV. Użycie i tworzenie strategii.

### Wymagania szczegółowe

9.6 Uczeń stosuje trygonometrię do obliczeń długości odcinków, miar kątów, pól powierzchni i objętości.

### Rozwiązanie (I sposób) — „najpierw wysokość ściany bocznej”



Wysokość  $h$  ściany bocznej jest równa  $h = \frac{a}{2} \operatorname{tg} \alpha$ . Z twierdzenia Pitagorasa wynika, że wysokość  $H$  ostrosłupa jest równa

$$H = \sqrt{h^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2} = \frac{a}{2} \cdot \sqrt{\operatorname{tg}^2 \alpha - 1}$$

Objętość  $V$  tego ostrosłupa jest więc równa

$$V = \frac{a^3}{6} \cdot \sqrt{\operatorname{tg}^2 \alpha - 1}.$$

### Schemat oceniania I sposobu rozwiązania

Rozwiązanie, w którym jest istotny postęp ..... 1 p.

Zdający wyznaczy wysokość  $h$  ściany bocznej tego ostrosłupa:  $h = \frac{a}{2} \operatorname{tg} \alpha$  i na tym zakończy lub dalej popełni błędy.

**Pokonanie zasadniczych trudności zadania** ..... **2 p.**

Zdający wyznaczy wysokość  $H$  tego ostrosłupa:  $H = \frac{a}{2} \cdot \sqrt{\operatorname{tg}^2 \alpha - 1}$  i na tym zakończy lub dalej popełni błędy.

**Rozwiązanie pełne** ..... **3 p.**

Zdający wyznaczy objętość  $V$  tego ostrosłupa  $V = \frac{a^3}{6} \cdot \sqrt{\operatorname{tg}^2 \alpha - 1}$ .

**Uwagi:**

1. Jeżeli zdający zapisze objętość ostrosłupa w postaci  $V = \frac{1}{3} a^2 \cdot \sqrt{\left(\frac{a}{2} \cdot \operatorname{tg} \alpha\right)^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2}$ , to otrzymuje **3 punkty**.


2. Co bardziej dociekliwi zdający mogą zauważyć, że  $\operatorname{tg}^2 \alpha - 1 = \frac{-\cos 2\alpha}{\cos^2 \alpha}$ . Wtedy:  
— wysokość  $H$  ostrosłupa przyjmuje postać

$$H = \frac{a}{2 \cos \alpha} \cdot \sqrt{-\cos 2\alpha},$$

— objętość ostrosłupa przyjmuje postać

$$V = \frac{a^3}{6 \cos \alpha} \cdot \sqrt{-\cos 2\alpha}.$$

**Rozwiązanie (II sposób)** — „najpierw krawędź boczna”



Długość  $b$  krawędzi bocznej tego ostrosłupa jest równa  $b = \frac{a}{2 \cos \alpha}$ . Z twierdzenia Pitagorasa wynika, że wysokość  $H$  ostrosłupa jest równa

$$H = \sqrt{b^2 - \left(\frac{a\sqrt{2}}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{a^2}{4 \cos^2 \alpha} - \frac{a^2}{2}} = \frac{a \cdot \sqrt{1 - 2 \cos^2 \alpha}}{2 \cos \alpha} = \frac{a}{2 \cos \alpha} \cdot \sqrt{-\cos 2\alpha}.$$

Objętość  $V$  tego ostrosłupa jest więc równa

$$V = \frac{a^3}{6 \cos \alpha} \cdot \sqrt{-\cos 2\alpha}.$$

## Schemat oceniania II sposobu rozwiązania

**Rozwiązanie, w którym jest istotny postęp** ..... **1 p.**

Zdający wyznaczy długość  $b$  krawędzi bocznej tego ostrosłupa:  $b = \frac{a}{2 \cos \alpha}$  i na tym zakończy lub dalej popełni błędy.

**Pokonanie zasadniczych trudności zadania** ..... **2 p.**

Zdający wyznaczy wysokość  $H$  tego ostrosłupa:  $H = \frac{a}{2 \cos \alpha} \cdot \sqrt{-\cos 2\alpha}$  i na tym zakończy lub dalej popełni błędy.

**Rozwiązanie pełne** ..... **3 p.**

Zdający wyznaczy objętość  $V$  tego ostrosłupa:  $V = \frac{a^3}{6 \cos \alpha} \cdot \sqrt{-\cos 2\alpha}$ .

### Uwaga


Jeżeli zdający zapisze objętość ostrosłupa w postaci  $V = \frac{1}{3} a^2 \sqrt{\left(\frac{a}{2 \cos \alpha}\right)^2 - \left(\frac{a\sqrt{2}}{2}\right)^2}$ , to otrzymuje **3 punkty**.

### Uwaga do treści zadania

W każdym ostrosłupie prawidłowym czworokątnym kąt  $\alpha$  jest większy od  $45^\circ$ . Ta dodatkowa informacja wpisana w treści zadania ma na celu zwrócenie zdającym uwagi na to, że nie będzie sprawdzane badanie warunku rozwiązywalności zadania w zależności od miary kąta  $\alpha$ . Uzasadnienie geometryczne tego warunku wymagałoby odrębnego rozumowania. Najprostsze takie rozumowanie wygląda następująco:

$$|\sphericalangle ABE| + |\sphericalangle CBE| > |\sphericalangle ABC|,$$


czyli  $2\alpha > 90^\circ$ , a więc  $\alpha > 45^\circ$ .



To rozumowanie wykracza poza obecną podstawę programową, gdyż nie ma w niej twierdzenia o tym, że suma dwóch kątów płaskich trójkąta jest większa od trzeciego kąta płaskiego.

## Zadanie 16. (6 p.)

Punkty  $M$  i  $L$  leżą odpowiednio na bokach  $AB$  i  $AC$  trójkąta  $ABC$ , przy czym zachodzą równości  $|MB| = 2 \cdot |AM|$  oraz  $|LC| = 3 \cdot |AL|$ . Punkt  $S$  jest punktem przecięcia odcinków  $BL$  i  $CM$ . Punkt  $K$  jest punktem przecięcia prostej  $AS$  z odcinkiem  $BC$  (zobacz rysunek).



Pole trójkąta  $ABC$  jest równe 660. Oblicz pola trójkątów:  $AMS$ ,  $ALS$ ,  $BMS$  i  $CLS$ .

### Wymagania ogólne


IV. Użycie i tworzenie strategii.

### Wymagania szczegółowe

7.5R Uczeń znajduje związki miarowe w figurach płaskich z zastosowaniem twierdzenia sinusów i twierdzenia cosinusów.

### Rozwiązanie (I sposób)

Oznaczmy literami  $x$  i  $y$  pola trójkątów  $AMS$  i  $ALS$ , czyli  $P_{AMS} = x$  i  $P_{ALS} = y$ .



Trójkąty  $AMC$  i  $BMC$  mają wspólną wysokość opuszczoną z wierzchołka  $C$ , więc

$$\frac{P_{AMC}}{P_{BMC}} = \frac{|AM|}{|BM|} = \frac{1}{2}, \quad \text{czyli} \quad P_{BMC} = 2 \cdot P_{AMC}.$$

Stąd

$$P_{AMC} = \frac{1}{3} \cdot P_{ABC} = \frac{1}{3} \cdot 660 = 220.$$

Podobnie

$$\frac{P_{AMS}}{P_{BMS}} = \frac{|AM|}{|BM|} = \frac{1}{2}, \quad \text{czyli} \quad P_{BMS} = 2 \cdot P_{AMS} = 2x.$$

Trójkąty  $ALB$  i  $CLB$  mają wspólną wysokość opuszczoną z wierzchołka  $B$ , więc

$$\frac{P_{ALB}}{P_{CLB}} = \frac{|AL|}{|CL|} = \frac{1}{3}, \quad \text{czyli} \quad P_{CLB} = 3 \cdot P_{ALB}.$$

Stąd

$$P_{ALB} = \frac{1}{4} \cdot P_{ABC} = \frac{1}{4} \cdot 660 = 165.$$

Podobnie

$$\frac{P_{ALS}}{P_{CLS}} = \frac{|AL|}{|CL|} = \frac{1}{3}, \quad \text{czyli} \quad P_{CLS} = 3 \cdot P_{ALS} = 3y.$$

Otrzymaliśmy więc

$$P_{AMC} = P_{AMS} + P_{ALS} + P_{CLS} = x + y + 3y = x + 4y,$$

czyli

$$x + 4y = 220.$$

Analogicznie

$$P_{ALB} = P_{AMS} + P_{ALS} + P_{BMS} = x + y + 2x = 3x + y,$$

czyli

$$3x + y = 165.$$

Pozostaje rozwiązać układ równań

$$\begin{cases} x + 4y = 220 \\ 3x + y = 165. \end{cases}$$


Rozwiązaniem tego układu jest  $x = 40$  i  $y = 45$ .

Zatem

$$P_{AMS} = x = 40, \quad P_{ALS} = y = 45, \quad P_{BMS} = 2x = 80, \quad P_{CLS} = 3y = 135.$$

### Uwaga

Możemy równie łatwo obliczyć pola pozostałych dwóch trójkątów, tj.  $CKS$  i  $BKS$ .



Oznaczając pola tych trójkątów odpowiednio przez  $w$  i  $z$  oraz zauważając, podobnie jak poprzednio, że

$$\frac{P_{BKA}}{P_{CKA}} = \frac{P_{BKS}}{P_{CKS}}, \quad \text{czyli} \quad \frac{3x + z}{4y + w} = \frac{z}{w},$$

a więc

$$\frac{120 + z}{180 + 2z} = \frac{z}{w},$$

otrzymujemy

$$120w + zw = 180z + zw,$$

$$2w = 3z.$$

Wystarczy teraz zauważyć, że  $P_{BCS} = 660 - 3x - 4y = 660 - 120 - 180 = 360$ , czyli  $w + z = 360$ . Stąd  $w = 360 - z$ , więc  $2(360 - z) = 3z$ , czyli  $z = 144$  i  $w = 216$ .

## Schemat oceniania I sposobu rozwiązania

**Rozwiązanie, w którym postęp jest niewielki, ale konieczny na drodze do pełnego rozwiązania** ..... **1 p.**

Zdający stwierdzi lub wykorzysta fakt, że stosunek pól dwóch trójkątów o wspólnej wysokości jest równy stosunkowi długości podstaw, na jakie ta wysokość została opuszczona i zapisze, np.:  $P_{MBC} = 2 \cdot P_{AMC}$ .

**Rozwiązanie, w którym jest istotny postęp** ..... **2 p.**

Zdający

- obliczy pole jednego z trójkątów:  $AMC$ ,  $BMC$ ,  $ALB$ ,  $CLB$

albo

- wyznaczy pole trójkąta  $BMS$  w zależności od pola trójkąta  $AMS$ :  $P_{BMS} = 2x$

albo

- wyznaczy pole trójkąta  $CLS$  w zależności od pola trójkąta  $ALS$ :  $P_{CLS} = 3y$ .

**Pokonanie zasadniczych trudności zadania** ..... **4 p.**

Zdający zapisze układ równań pozwalający obliczyć pola trójkątów  $AMS$  i  $ALS$ , np.  $x + 4y = 220$  i  $3x + y = 165$ .

### Uwaga

Jeżeli zdający zapisze tylko jedno równanie z dwiema niewiadomymi, np.  $x + 4y = 220$ , to otrzymuje **3 punkty**.

**Rozwiązanie zadania do końca lecz z usterkami, które jednak nie przekreślają poprawności rozwiązania (np. błędy rachunkowe)** ..... **5 p.**

Zdający

- obliczy pole jednego z trójkątów  $AMS$  lub  $ALS$ :  $x = 40$ ,  $y = 45$

albo

- obliczy pola wszystkich trójkątów:  $AMS$ ,  $ALS$ ,  $BMS$  i  $CLS$  popełniając błędy rachunkowe.

**Rozwiązanie pełne** ..... **6 p.**

Zdający obliczy pola trójkątów  $AMS$ ,  $ALS$ ,  $BMS$  i  $CLS$ :  $P_{AMS} = 40$ ,  $P_{BMS} = 80$ ,  $P_{ALS} = 45$ ,  $P_{CLS} = 135$ .

**Zadanie 17.** (6 p.)

Oblicz, ile jest stycyfrowych liczb naturalnych o sumie cyfr równej 4.

**Wymagania ogólne**

*IV. Użycie i tworzenie strategii.*

**Wymagania szczegółowe**

*10.1R Uczeń wykorzystuje wzory na liczbę permutacji, kombinacji, wariacji i wariacji z powtórzeniami do zliczania obiektów w bardziej złożonych sytuacjach kombinatorycznych.*

**Rozwiązanie**

Wszystkie liczby stycyfrowe o sumie cyfr równej 4 możemy podzielić na 7 grup w zależności od tego, jakie cyfry występują w zapisie dziesiętnym tych liczb:

- I Liczba 4000...000, w której po cyfrze 4 następuje 99 zer: jest 1 taka liczba,
- II Liczby postaci 3000...1...000, w których po cyfrze 3 występuje 98 cyfr 0 i jedna cyfra 1, stojąca na jednym z 99 możliwych miejsc: jest 99 takich liczb,
- III Liczby postaci 2000...2...000, w których po cyfrze 2 występuje 98 cyfr 0 i jedna cyfra 2, stojąca na jednym z 99 możliwych miejsc: jest 99 takich liczb,
- IV Liczby postaci 1000...3...000, w których po cyfrze 1 występuje 98 cyfr 0 i jedna cyfra 3, stojąca na jednym z 99 możliwych miejsc: jest 99 takich liczb,
- V Liczby postaci 2000...1...000...1...000, w których po cyfrze 2 występuje 97 cyfr 0 i dwie cyfry 1, stojące na dwóch miejscach wybranych z 99 możliwych miejsc: jest

$$\binom{99}{2} = \frac{99 \cdot 98}{2} = 99 \cdot 49 = 4851$$

takich liczb,

- VI Liczby postaci 1000...2...000...1...000 lub 1000...1...000...2...000, w których po cyfrze 1 występuje 97 cyfr 0 oraz cyfry 1 i 2 (w dowolnej kolejności), stojące na dwóch miejscach wybranych z 99 możliwych miejsc: jest

$$2 \cdot \binom{99}{2} = 2 \cdot \frac{99 \cdot 98}{2} = 99 \cdot 98 = 9702$$

takich liczb,

- VII Liczby postaci 1000...1...000...1...000...1...000, w których po cyfrze 1 występuje 96 cyfr 0 i trzy cyfry 1, stojące na trzech miejscach wybranych z 99 możliwych miejsc: jest

$$\binom{99}{3} = \frac{99 \cdot 98 \cdot 97}{6} = 33 \cdot 49 \cdot 97 = 156849$$

takich liczb.

Łącznie zatem mamy  $1 + 3 \cdot 99 + 4851 + 9702 + 156849 = 171700$  takich liczb.

**Schemat oceniania**

W rozwiązaniu można wyróżnić 3 etapy:

**Pierwszy** – wstępny:

zauważenie, że należy rozpatrzyć przypadki i zapisanie, że jest jedna stycyfrowa liczba, której pierwszą cyfrą jest 4 a po niej następuje 99 zer (grupa I).

**Drugi** – składający się z rozważenia czterech przypadków:

1. obliczenie, ile jest stycyfrowych liczb postaci  $3000\dots1\dots000$ , w których po cyfrze 3 występuje 98 cyfr 0 i jedna cyfra 1 oraz ile jest stycyfrowych liczb postaci  $2000\dots2\dots000$ , w których po cyfrze 2 występuje 98 cyfr 0 i jedna cyfra 2 oraz ile jest stycyfrowych liczb postaci  $1000\dots3\dots000$ , w których po cyfrze 1 występuje 98 cyfr 0 i jedna cyfra 3 (grupy II, III i IV),
2. obliczenie, ile jest stycyfrowych liczb postaci  $2000\dots1\dots000\dots1\dots000$ , w których po cyfrze 2 występuje 97 cyfr 0 i dwie cyfry 1 stojące na dwóch miejscach wybranych z 99 możliwych miejsc (grupa V),
3. obliczenie, ile jest stycyfrowych liczb postaci

$$1000\dots2\dots000\dots1\dots000 \quad \text{oraz} \quad 1000\dots1\dots000\dots2\dots000,$$

w których po cyfrze 1 występuje 97 cyfr 0 oraz cyfry 1 i 2 (w dowolnej kolejności), stojące na dwóch miejscach wybranych z 99 możliwych miejsc (grupa VI),

4. obliczenie, ile jest stycyfrowych liczb postaci  $1000\dots1\dots000\dots1\dots000\dots1\dots000$ , w których po cyfrze 1 występuje 96 cyfr 0 i trzy cyfry 1, stojące na trzech miejscach wybranych z 99 możliwych miejsc (grupa VII).

**Trzeci** – obliczenia końcowe:

obliczenie, ile jest wszystkich stycyfrowych liczb naturalnych o sumie cyfr równej 4.

**Rozwiązanie, w którym postęp jest niewielki, ale konieczny na drodze do pełnego rozwiązania** ..... **1 p.**

Realizacja pierwszego etapu rozwiązania – zapisanie, że jest jedna stycyfrowa liczba, której pierwszą cyfrą jest 4 a po niej następuje 99 zer.

**Pokonanie zasadniczych trudności zadania** ..... **5 p.**

Realizacja drugiego etapu rozwiązania – zdający otrzymuje **po jednym punkcie** za obliczenie ile jest stycyfrowych liczb w każdym z wymienionych przypadków, odpowiednio:

1.  $3 \cdot 99 = 297$ ,
2.  $\binom{99}{2} = \frac{99 \cdot 98}{2} = 99 \cdot 49 = 4851$ ,
3.  $2 \binom{99}{2} = 2 \cdot \frac{99 \cdot 98}{2} = 99 \cdot 98 = 9702$ ,
4.  $\binom{99}{3} = \frac{99 \cdot 98 \cdot 97}{6} = 33 \cdot 49 \cdot 97 = 156849$ .

W tej części rozwiązania zdający może otrzymać od 0 punktów do 4 punktów.

**Rozwiązanie pełne** ..... **6 p.**

Obliczenie, ile jest wszystkich stycyfrowych liczb naturalnych o sumie cyfr równej 4: jest 171700 takich liczb.

**Uwaga**


Zadanie można rozwiązać powołując się na nietrudne do udowodnienia twierdzenie, że dla  $k \leq 9$  istnieje  $\binom{n+k-2}{k-1}$  liczb  $n$ -cyfrowych o sumie cyfr równej  $k$ . (Istnieje  $\binom{n+k-2}{k-1}$  ciągów  $(a_1, \dots, a_n)$  takich, że  $a_1, \dots, a_n$  są liczbami całkowitymi,  $a_1 \neq 0$ ,  $a_2, \dots, a_n \geq 0$  oraz  $a_1 + \dots + a_n = k$ ).

W naszym przypadku mamy  $n = 100$  i  $k = 4$ :

$$\binom{n+k-2}{k-1} = \binom{102}{3} = \frac{102 \cdot 101 \cdot 100}{6} = 17 \cdot 101 \cdot 100 = 171700.$$

**Zadanie 18.** (7 p.)

Dany jest prostokątny arkusz kartonu o długości 80 cm i szerokości 50 cm. W czterech rogach tego arkusza wycięto kwadratowe naroża (zobacz rysunek).



Następnie zagięto karton wzdłuż linii przerywanych, tworząc w ten sposób prostopadłościenną pudełko (bez przykrywki). Oblicz długość boku wyciętych kwadratowych naroży, dla której objętość otrzymanego pudełka jest największa. Oblicz tę objętość.

**Wymagania ogólne**

III. Modelowanie matematyczne

**Wymagania szczegółowe**

11.6R Uczeń stosuje pochodne do rozwiązywania zagadnień optymalizacyjnych.

**Ogólny schemat oceniania**

Rozwiązanie zadania optymalizacyjnego za pomocą rachunku różniczkowego składa się z trzech etapów:

1. Zbudowanie modelu matematycznego (**3 p.**).
2. Zbadanie tego modelu (**3 p.**).
3. Wyciągnięcie wniosków, końcowe obliczenia itp. (**1 p.**).

W pierwszych dwóch etapach można wyróżnić następujące części:

- 1.a) wybór zmiennej i wyrażenie za pomocą tej zmiennej wielkości, które będą potrzebne do zdefiniowania funkcji,
- 1.b) zdefiniowanie funkcji jednej zmiennej,
- 1.c) określenie dziedziny tej funkcji,
- 2.a) wyznaczenie pochodnej,
- 2.b) obliczenie miejsc zerowych tej pochodnej,
- 2.c) uzasadnienie (np. badanie monotoniczności funkcji), że funkcja posiada wartość najmniejszą/największą.

Za poprawne rozwiązanie każdej z powyższych części zdający otrzymuje **1 punkt**, o ile **poprzednia część danego etapu** została zrealizowana bezbłędnie.

### Rozwiązanie (I sposób)

Oznaczmy literą  $x$  długość boku kwadratowych naroży. Podstawa pudełka ma wymiary

$$(80 - 2x) \times (50 - 2x).$$

Wysokość pudełka jest równa  $x$ . Zatem objętość wyraża się wzorem

$$V = (80 - 2x) \cdot (50 - 2x) \cdot x,$$

czyli

$$V = (4000 - 160x - 100x + 4x^2) \cdot x = 4x^3 - 260x^2 + 4000x = 4(x^3 - 65x^2 + 1000x).$$

Naszym zadaniem jest obliczenie, dla jakiego  $x$  (spełniającego nierówności  $0 < x < 25$ ) funkcja  $f$  określona wzorem

$$f(x) = x^3 - 65x^2 + 1000x$$

przyjmuje największą wartość. Obliczamy pochodną tej funkcji:

$$f'(x) = 3x^2 - 130x + 1000.$$

Następnie znajdujemy miejsca zerowe tej pochodnej:

$$\Delta = 130^2 - 12 \cdot 1000 = 16900 - 12000 = 4900,$$

$$x_1 = \frac{130 - 70}{6} = 10, \quad x_2 = \frac{130 + 70}{6} \approx 33,33.$$

Pierwiastek  $x_2$  nie spełnia nierówności  $0 < x_2 < 25$ . Zatem jedynym argumentem podejrzanym o ekstremum lokalne w rozważanym przedziale jest  $x_1 = 10$ . Ponieważ

$$f'(x) > 0 \quad \text{dla } x < 10$$

oraz

$$f'(x) < 0 \quad \text{dla } x > 10,$$

więc w przedziale  $(0, 10)$  funkcja  $f$  jest rosnąca i w przedziale  $(10, 25)$  jest malejąca. Stąd wynika, że w punkcie  $x = 10$  funkcja  $f$  przyjmuje największą wartość. Szukana objętość jest zatem równa

$$V = (80 - 20) \cdot (50 - 20) \cdot 10 = 18000 \text{ cm}^2.$$

## Schemat oceniania I sposobu rozwiązania

Rozwiązanie zadania składa się z trzech etapów, opisanych ogólnie na stronie 27.

- 1.a) Oznaczenie literą np.  $x$  długości boku kwadratowych naroży, zapisanie długości podstawy pudełka  $(80 - 2x)$  i szerokości podstawy pudełka  $(50 - 2x)$ .
- 1.b) Zapisanie objętości jako funkcji zmiennej wysokości pudełka  $x$ :  $V = (80 - 2x) \cdot (50 - 2x) \cdot x$ .
- 1.c) Zapisanie warunków, jakie musi spełniać wysokość pudełka:  $0 < x < 25$ .
- 2.a) Obliczenie pochodnej wprowadzonej funkcji np.  $f$ :  $f'(x) = 3x^2 - 130x + 1000$ .
- 2.b) Obliczenie miejsc zerowych:  $x_1 = 10$ ,  $x_2 = 33\frac{1}{3}$ .
- 2.c) Stwierdzenie, że  $f'(x) > 0$  dla  $0 < x < 10$  oraz  $f'(x) < 0$  dla  $10 < x < 25$ , więc w przedziale  $(0, 10)$  funkcja  $f$  jest rosnąca i w przedziale  $(10, 25)$  jest malejąca. Stąd wynika, że dla  $x = 10$  funkcja  $f$  przyjmuje największą wartość w dziedzinie  $(0, 25)$ .
3. Zapisanie, że długość boku kwadratowych naroży jest równa 10 cm i obliczenie największej objętości:  $V = (80 - 20) \cdot (50 - 20) \cdot 10 = 18000 \text{ cm}^3$ .

## Rozwiązanie (II sposób)

Oznaczmy literą  $x$  długość podstawy pudełka. Długość boku kwadratowych naroży (więc również wysokość pudełka) jest wtedy równa  $\frac{80-x}{2}$ , zaś szerokość podstawy pudełka:  $50 - 2 \cdot \frac{80-x}{2}$ .

Zatem objętość wyraża się wzorem  $V = (x - 30) \cdot \frac{80-x}{2} \cdot x$ , dla  $30 < x < 80$

$$V(x) = 0,5x \cdot (x - 30) \cdot (80 - x) = 0,5(80x^2 - x^3 - 2400x + 30x^2) = -\frac{1}{2}x^3 + \frac{110}{2}x^2 - 1200x.$$

Obliczamy, dla jakiego argumentu funkcja objętości przyjmuje największą wartość.

$$V'(x) = -\frac{3}{2}x^2 + 110x - 1200.$$

Wyznaczamy miejsca zerowe tej pochodnej:  $\Delta = 12100 - 7200$ ,  $\Delta = 4900$ ,  $x_1 = \frac{110-70}{3} = \frac{40}{3}$ ,  $x_2 = \frac{110+70}{3} = 60$ . Po uwzględnieniu dziedziny otrzymujemy  $x = 60$ . Ponieważ  $V'(x) > 0$  dla  $30 < x < 60$  oraz  $V'(x) < 0$  dla  $60 < x < 80$ , więc w przedziale  $(30, 60)$  funkcja  $V$  jest rosnąca i w przedziale  $(60, 80)$  jest malejąca. Stąd wynika, że dla  $x = 60$  funkcja  $V$  przyjmuje największą wartość w dziedzinie  $(30, 80)$ . Długość boku kwadratowych naroży jest równa  $\frac{80-60}{2} = 10$  cm, szukana objętość jest równa  $(60 - 30) \cdot \frac{80-60}{2} \cdot 60 = 18000 \text{ cm}^3$ .

## Schemat oceniania II sposobu rozwiązania

Rozwiązanie zadania składa się z trzech etapów, opisanych ogólnie na stronie 27.

- 1.a) Oznaczenie literą np.  $x$  długości boku podstawy pudełka, zapisanie szerokości podstawy pudełka  $50 - 2 \cdot \frac{80-x}{2}$  i wysokości pudełka  $\frac{80-x}{2}$ .

- 1.b) Zapisanie objętości jako funkcji zmiennej długości podstawy pudełka  $x$ :  $V = (x-30) \cdot \frac{80-x}{2} \cdot x$ .
- 1.c) Zapisanie warunków, jakie musi spełniać długość podstawy pudełka:  $30 < x < 80$ .
- 2.a) Obliczenie pochodnej funkcji  $V$ :  $V'(x) = -\frac{3}{2}x^2 + 110x - 1200$ .
- 2.b) Obliczenie miejsc zerowych:  $x_1 = \frac{40}{3}$ ,  $x_2 = 60$ .
- 2.c) Stwierdzenie, że  $V'(x) > 0$  dla  $30 < x < 60$  oraz  $V'(x) < 0$  dla  $60 < x < 80$ , więc w przedziale  $(30, 60)$  funkcja  $V$  jest rosnąca i w przedziale  $(60, 80)$  jest malejąca. Stąd wynika, że dla  $x = 60$  funkcja  $V$  przyjmuje największą wartość w dziedzinie  $(30, 80)$ .
3. Obliczenie długości boku kwadratowych naroży  $\frac{80-60}{2} = 10$  cm.  
Obliczenie największej objętości:

$$V = (60 - 30) \cdot \frac{80 - 60}{2} \cdot 60 = 18000 \text{ cm}^3.$$

### Rozwiązanie (III sposób)

Oznaczmy literą  $x$  szerokość podstawy pudełka. Długość boku kwadratowych naroży (więc również wysokość pudełka) jest wtedy równa  $\frac{50-x}{2}$ , zaś długość podstawy pudełka:  $80 - 2 \cdot \frac{50-x}{2}$ .  
Zatem objętość wyraża się wzorem  $V = (x+30) \cdot \frac{50-x}{2} \cdot x$ , dla  $0 < x < 50$ .

$$V(x) = 0,5x \cdot (x+30) \cdot (50-x) = 0,5(50x^2 - x^3 - 1500x - 30x^2) = -\frac{1}{2}x^3 + 10x^2 - 750x.$$

Obliczamy dla jakiego argumentu funkcja objętości przyjmuje największą wartość.

$$V'(x) = -\frac{3}{2}x^2 + 20x - 750.$$

Wyznaczamy miejsca zerowe tej pochodnej:  $\Delta = 4900$ ,  $x_1 = \frac{20-70}{3} = -\frac{50}{3}$ ,  $x_2 = \frac{20+70}{3} = 30$ . Po uwzględnieniu dziedziny otrzymujemy  $x = 30$ . Ponieważ  $V'(x) > 0$  dla  $0 < x < 30$  oraz  $V'(x) < 0$  dla  $30 < x < 50$ , więc w przedziale  $(0, 30)$  funkcja  $V$  jest rosnąca i w przedziale  $(30, 50)$  jest malejąca. Stąd wynika, że dla  $x = 30$  funkcja  $V$  przyjmuje największą wartość w dziedzinie  $(0, 50)$ . Długość boku kwadratowych naroży jest równa  $\frac{50-30}{2} = 10$  cm, szukana objętość jest równa

$$V = (30+30) \cdot \frac{50-30}{2} \cdot 30 = 18000 \text{ cm}^3.$$

### Schemat oceniania III sposobu rozwiązania

Rozwiązanie zadania składa się z trzech etapów, opisanych ogólnie na stronie 27.

- 1.a) Oznaczenie literą np.  $x$  szerokości podstawy pudełka, zapisanie długości podstawy pudełka  $80 - 2 \cdot \frac{50-x}{2}$  i wysokości pudełka  $\frac{50-x}{2}$ .
- 1.b) Zapisanie objętości jako funkcji zmiennej długości podstawy pudełka  $x$ :  $V = (x+30) \cdot \frac{50-x}{2} \cdot x$ .

- 1.c) Zapisanie warunków, jakie musi spełniać szerokość podstawy pudełka:  $0 < x < 50$ .
- 2.a) Obliczenie pochodnej funkcji  $V$ :  $V'(x) = -\frac{3}{2}x^2 + 20x - 750$ .
- 2.b) Obliczenie miejsc zerowych:  $x_1 = \frac{20-70}{3} = -\frac{50}{3}$ ,  $x_2 = \frac{20+70}{3} = 30$ .
- 2.c) Stwierdzenie, że  $V'(x) > 0$  dla  $0 < x < 30$  oraz  $V'(x) < 0$  dla  $30 < x < 50$ , więc w przedziale  $(0, 30)$  funkcja  $V$  jest rosnąca i w przedziale  $(30, 50)$  jest malejąca. Stąd wynika, że dla  $x = 30$  funkcja  $V$  przyjmuje największą wartość w dziedzinie  $(0, 50)$ .
3. Obliczenie długości boku kwadratowych naroży  $\frac{50-30}{2} = 10$  cm.  
Obliczenie największej objętości:  $V = 60 \cdot 10 \cdot 30 = 18000$  cm<sup>3</sup>.